



Instrucțiuni de utilizare

CHIRAFILON MONOFILAMENT

Este un fir chirurgical absolut neresorbabil, steril monofil pe baza de teflon

Descrierea produsului: Chirafilon este un fir monofil sintetic, neresorbabil, fabricat din (polivinilidendifluorură, PVDF). Pentru o mai bună vizibilitate în domeniul chirurgical, firele sunt colorate cu un colorant permanent aprobat pentru uz medical. Fir are o suprafață netedă, hidrofoabă și se poate bine înțoda. Sterilizat în stare în total inert. Nu este supus în țesut degradării enzimatice, nici după o implantare pe termen lung. Șiș mintene forță sa tensiil pe termen lung și are proprietăți de înnoare deosebite.

Indicații: În general, ori de câte ori este necesară fermitatea pe un termen lung cu garanție mecanică permanentă a forței tensile a structurilor, se utilizează în toate ramurile, mai ales în ortopedie, traumatologie (tendoare), chirurgie plastică și oftalmologie (firul ideal temporal, uror, ure de îndepărtat).

Reacția în țesut: Chirafilon determină în țesuturi o minimă reacție inflamatorie inițială, care e urmată treptat de încapsularea suturei în țesut conjunctiv fibros. Nu interferează cu infecția în rană, noduri din rană nu se exclud.

Contraindicații: Datorită neresorbabilității absolute, nu poate fi folosit la suturi, care ar trebui să fie înlocuite la structuri tubulare ale tractului digestiv și alilor urinare de eliminare.

Avvertiment: Atenție - Nu deteriorați firul cu instrumente chirurgicale (chiusuri,clește, pensete, etc.). Firul fracturi frului.

Produsul nu va ieie să utilizezi în mod repetat, acesta nu ar fi steril.

Principiile de manipulare: Produs este destinat pentru o singură utilizare!
Nu folosiți produse cu ambalaj deteriorat!
Înainte de utilizări, verificați data de expirare înscrisă pe ambalaj!

Nu utilizați produsul după data de expirare!
Nu sterilizați din nou!
Cu materiale de sutură pot manipula numai persoane instruite (medici, asistente medicale).

Procedură la deschiderea saculețului cu material de sutură steril: Scoateți saculețul din cutie netesit, prindeți cu ambele mâini și trageți mâinile până la deschide saculețul. În continuare lucrați degea sterili! Saculețul cu casorolă, nu deteriorați: după deschiderii pungii, selectați și descărcați tubul cu înveli, prin separarea părții învelișului tubului în locul perforației, prin instrument chiburea prindeți acul în partea de la 1/3 până la 1/2 distanței dintre capătul și vârful și prin trageri în direcție din tub, ușor scoateți înveliș. La scoaterea învelișului ușor griți pentru a menține sterilitatea. La scoaterea învelișului traumatic din tub, întotdeauna utilizați instrument chiburea.

Produsul este steril, fir scos în afară ambalajului este destinat pentru utilizare imediată!
Materialul rămas utilizat, lichidul în containere destinate - prevenirea rănirii personalului medical.
La corecții și descărca manipulare cu produsul, producător asigură o calitate absolută.

Sterilizare: Produsul este sterilizat prin radiație cu oxid de etilenă sau raze de radiație gamma.
Depozitare: Produsele trebuie depozitate în ambalajul original, în încăperi curate, uscate, la o temperatură de 10-25 °C, ferit de lumină și de orice efecte vaporilor.

Brucksvänsning

CHIRAFILON MONOFILAMENT

Sterilt monofilament, ikke-absorberbar kirurgisk sutur av polyvinylidendifluorid

Produktbeskrivelse: Chirafilon er en syntetisk, ikke-absorberbar monofilamentsutrustning sammensatt av polyvinylidendifluorid (PVDF). For forbedret synlighet i operasjonssjelfter er Chirafilon fargelagt med ikke-irriterende farge, godkjent for bruk i medisinske instrumenter. Sutråden er vannavstøtende, med glatt overflate og lett å knytte. Tråden brytes ikke ned av enzymer i vevet, selv etter lang tids implantering, og den er inaktiv i vevet. Chirafilon bærer strekkstyrken sin og pålidelig knute i lang tid.

Indikasjoner: Generelt i alle tilfeller hvor det er behov for garantit langtidstid eller permanent fasthet for strukturer under strekkbelastning – for eksempel i tyktveier, spesielt ortopedi, traumatologi (senner), plastikk og oftalmisk kirurgi (optimalt temporeng stng som er lett å fjerne).

Reaksjon i vev: Chirafilon utløser mild betennelsesreaksjon i vevet, deretter omslutes suturen gradvis av forbindende vevfibre. Dette forårsaker ikke foreliggende sårinfeksjon. Knuten avstøttes ikke.

Interaksjon: Denne suturen må ikke penetrere i galle-, spyttkjertel eller urinerirer.

Advarsel: Det må utvises forsiktighet så ikke det oppstår skader på materialet med kirurgiske instrumenter (nålholdere, tenger osv.) da dette kan føre til telt brudd i materialet. Dette produktet skal ikke brukes flere ganger. Produktet kan ikke steriliseres.
Instruksjoner for bruk: Produktet er kun til engangsbruk! Må ikke brukes hvis pakningen er åpenet eller er skadet! Kontroller utløpsdatoen på pakken før bruk! Produktet må ikke brukes etter utløpsdatoen! Må ikke resteriliseres!
Kun kvalifisert personale (leger, sykepleiere) skal håndtere dette kirurgiske suturmaterialet.

Frengangsnotat for åpning av posen med kirurgisk suturmateriale: Ta posen ut av esken med begge hender, åpne posen ved å trekke i de to løse endene, slik at steriliteten til det kirurgiske utstyret ikke brytes. Ikke bøy posen med suturmaterialet. Ved overføring på traumatisk nåler: skill av den øverste delen av papirposen, grip nålen med nålholderen og arbeid mellom en tredjedel (1/3) og en halvdel (1/2) av avstanden fra enden til spissen, og trek den ut av posen. Ikke bryt suturen sterilitet under utpakkning. Bruk alltid en nålholder når nålen fjernes fra esken.

Nåleholder: Produktet er sterilisert med etylenoksid eller gjennom stråling med gammastråler.
Lagring: Suturen skal lagres i originalemballasjen i et rent, tørt rom ved en temperatur på mellom 10 °C og 25 °C, beskyttet mot direkte lys og alle typer fuktighet.

Instrukcia zastosowania

CHIRAFILON MONOFILAMENT

Sterylne, chirurgiczne, absolutnie nieresorbowne, monofilowe włókno na bazie teflonu

Opis wyrobu: Chirafilon jest syntetycznym, absolutnie nieresorbownym włóknom monofilowym, wykonanym z teflonu (politłwinylidendifluoridu, PTFE). Dla lepszej widoczności w polu operacyjnym włókno są zabarwione barwnikiem zatwierdzonym dla potrzeb medycznych. Włókno ma gładką, hydrofobową powierzchnię i dobrze się wiaje. Biologiczne włókno jest całkowicie inerte Nie podlega w tkankach degradacji enzymatycznej nawet po długotrwałym wyszczerpieniu. Zachowuje długotrwałe wytrzymałość na rozciąganie i niezawodność wężłoz.

Indykacja: Wzrost w toate czaurze iu care e necesară fermitatea pe termen lung sau chiar permanentă a structurilor supuse

forțelor tensile – în toate ramurile chirurgicale, mai ales în chirurgie cardiacă, ortopedică, oftalmologică (tendoane), chirurgie plastică și oftalmologie (firul temporal ideal, foarte ușor de îndepărtat).

Reacția țesuturilor: Chirafilon determină în țesuturi o minimă reacție inflamatorie inițială, care e urmată treptat de încapsularea suturei în țesut conjunctiv fibros. Nu interfează cu infecția în rană, noduri din rană nu se exclud.

Reacția în țesut: Chirafilon determină în țesuturi o minimă reacție inflamatorie inițială, care e urmată treptat de încapsularea suturei în țesut conjunctiv fibros. Nu interferează cu infecția în rană, noduri din rană nu se exclud.

Contraindicații: Datorită neresorbabilității absolute, nu poate fi folosit la suturi, care ar trebui să fie înlocuite la structuri tubulare ale tractului digestiv și alilor urinare de eliminare.

Avvertiment: Atenție - Nu deteriorați firul cu instrumente chirurgicale (chiusuri,clește, pensete, etc.). Firul fracturi frului.

Produsul nu va ieie să utilizezi în mod repetat, acesta nu ar fi steril.

Principiile de manipulare: Produs este destinat pentru o singură utilizare!
Nu folosiți produse cu ambalaj deteriorat!
Înainte de utilizări, verificați data de expirare înscrisă pe ambalaj!

Nu utilizați produsul după data de expirare!
Nu sterilizați din nou!
Cu materiale de sutură pot manipula numai persoane instruite (medici, asistente medicale).

Procedură la deschiderea saculețului cu material de sutură steril: Scoateți saculețul din cutie netesit, prindeți cu ambele mâini și trageți mâinile până la deschide saculețul. În continuare lucrați degea sterili! Saculețul cu casorolă, nu deteriorați: după deschiderii pungii, selectați și descărcați tubul cu înveli, prin separarea părții învelișului tubului în locul perforației, prin instrument chiburea prindeți acul în partea de la 1/3 până la 1/2 distanței dintre capătul și vârful și prin trageri în direcție din tub, ușor scoateți înveliș. La scoaterea învelișului ușor griți pentru a menține sterilitatea. La scoaterea învelișului traumatic din tub, întotdeauna utilizați instrument chiburea.

Produsul este steril, fir scos în afară ambalajului este destinat pentru utilizare imediată!
Materialul rămas utilizat, lichidul în containere destinate - prevenirea rănirii personalului medical.
La corecții și descărca manipulare cu produsul, producător asigură o calitate absolută.

Sterilizare: Produsul este sterilizat prin radiație cu oxid de etilenă sau raze de radiație gamma.
Depozitare: Produsele trebuie depozitate în ambalajul original, în încăperi curate, uscate, la o temperatură de 10-25 °C, ferit de lumină și umezeală.

Contraindicații: Datorită neresorbabilității absolute, nu poate fi folosit la suturi, care ar trebui să fie înlocuite la structuri tubulare ale tractului digestiv și alilor urinare de eliminare.

Avvertiment: Atenție - Nu deteriorați firul cu instrumente chirurgicale (chiusuri,clește, pensete, etc.). Firul fracturi frului.

Produsul nu va ieie să utilizezi în mod repetat, acesta nu ar fi steril.

Principiile de manipulare: Produs este destinat pentru o singură utilizare!
Nu folosiți produse cu ambalaj deteriorat!
Înainte de utilizări, verificați data de expirare înscrisă pe ambalaj!

Nu utilizați produsul după data de expirare!
Nu sterilizați din nou!
Cu materiale de sutură pot manipula numai persoane instruite (medici, asistente medicale).

Procedură la deschiderea saculețului cu material de sutură steril: Scoateți saculețul din cutie netesit, prindeți cu ambele mâini și trageți mâinile până la deschide saculețul. În continuare lucrați degea sterili! Saculețul cu casorolă, nu deteriorați: după deschiderii pungii, selectați și descărcați tubul cu înveli, prin separarea părții învelișului tubului în locul perforației, prin instrument chiburea prindeți acul în partea de la 1/3 până la 1/2 distanței dintre capătul și vârful și prin trageri în direcție din tub, ușor scoateți înveliș. La scoaterea învelișului ușor griți pentru a menține sterilitatea. La scoaterea învelișului traumatic din tub, întotdeauna utilizați instrument chiburea.

Produsul este steril, fir scos în afară ambalajului este destinat pentru utilizare imediată!
Materialul rămas utilizat, lichidul în containere destinate - prevenirea rănirii personalului medical.
La corecții și descărca manipulare cu produsul, producător asigură o calitate absolută.

Sterilizare: Produsul este sterilizat prin radiație cu oxid de etilenă sau raze de radiație gamma.
Depozitare: Produsele trebuie depozitate în ambalajul original, în încăperi curate, uscate, la o temperatură de 10-25 °C, ferit de lumină și umezeală.

Contraindicații: Datorită neresorbabilității absolute, nu poate fi folosit la suturi, care ar trebui să fie înlocuite la structuri tubulare ale tractului digestiv și alilor urinare de eliminare.

Avvertiment: Atenție - Nu deteriorați firul cu instrumente chirurgicale (chiusuri,clește, pensete, etc.). Firul fracturi frului.

Produsul nu va ieie să utilizezi în mod repetat, acesta nu ar fi steril.

Principiile de manipulare: Produs este destinat pentru o singură utilizare!
Nu folosiți produse cu ambalaj deteriorat!
Înainte de utilizări, verificați data de expirare înscrisă pe ambalaj!

Nu utilizați produsul după data de expirare!
Nu sterilizați din nou!
Cu materiale de sutură pot manipula numai persoane instruite (medici, asistente medicale).

Procedură la deschiderea saculețului cu material de sutură steril: Scoateți saculețul din cutie netesit, prindeți cu ambele mâini și trageți mâinile până la deschide saculețul. În continuare lucrați degea sterili! Saculețul cu casorolă, nu deteriorați: după deschiderii pungii, selectați și descărcați tubul cu înveli, prin separarea părții învelișului tubului în locul perforației, prin instrument chiburea prindeți acul în partea de la 1/3 până la 1/2 distanței dintre capătul și vârful și prin trageri în direcție din tub, ușor scoateți înveliș. La scoaterea învelișului ușor griți pentru a menține sterilitatea. La scoaterea învelișului traumatic din tub, întotdeauna utilizați instrument chiburea.

Produsul este steril, fir scos în afară ambalajului este destinat pentru utilizare imediată!
Materialul rămas utilizat, lichidul în containere destinate - prevenirea rănirii personalului medical.
La corecții și descărca manipulare cu produsul, producător asigură o calitate absolută.

Sterilizare: Produsul este sterilizat prin radiație cu oxid de etilenă sau raze de radiație gamma.
Depozitare: Produsele trebuie depozitate în ambalajul original, în încăperi curate, uscate, la o temperatură de 10-25 °C, ferit de lumină și umezeală.

Contraindicații: Datorită neresorbabilității absolute, nu poate fi folosit la suturi, care ar trebui să fie înlocuite la structuri tubulare ale tractului digestiv și alilor urinare de eliminare.

Avvertiment: Atenție - Nu deteriorați firul cu instrumente chirurgicale (chiusuri,clește, pensete, etc.). Firul fracturi frului.

Produsul nu va ieie să utilizezi în mod repetat, acesta nu ar fi steril.

Principiile de manipulare: Produs este destinat pentru o singură utilizare!
Nu folosiți produse cu ambalaj deteriorat!
Înainte de utilizări, verificați data de expirare înscrisă pe ambalaj!

Nu utilizați produsul după data de expirare!
Nu sterilizați din nou!
Cu materiale de sutură pot manipula numai persoane instruite (medici, asistente medicale).

Procedură la deschiderea saculețului cu material de sutură steril: Scoateți saculețul din cutie netesit, prindeți cu ambele mâini și trageți mâinile până la deschide saculețul. În continuare lucrați degea sterili! Saculețul cu casorolă, nu deteriorați: după deschiderii pungii, selectați și descărcați tubul cu înveli, prin separarea părții învelișului tubului în locul perforației, prin instrument chiburea prindeți acul în partea de la 1/3 până la 1/2 distanței dintre capătul și vârful și prin trageri în direcție din tub, ușor scoateți înveliș. La scoaterea învelișului ușor griți pentru a menține sterilitatea. La scoaterea învelișului traumatic din tub, întotdeauna utilizați instrument chiburea.

Produsul este steril, fir scos în afară ambalajului este destinat pentru utilizare imediată!
Materialul rămas utilizat, lichidul în containere destinate - prevenirea rănirii personalului medical.
La corecții și descărca manipulare cu produsul, producător asigură o calitate absolută.

Sterilizare: Produsul este sterilizat prin radiație cu oxid de etilenă sau raze de radiație gamma.
Depozitare: Produsele trebuie depozitate în ambalajul original, în încăperi curate, uscate, la o temperatură de 10-25 °C, ferit de lumină și umezeală.

Contraindicații: Datorită neresorbabilității absolute, nu poate fi folosit la suturi, care ar trebui să fie înlocuite la structuri tubulare ale tractului digestiv și alilor urinare de eliminare.

Avvertiment: Atenție - Nu deteriorați firul cu instrumente chirurgicale (chiusuri,clește, pensete, etc.). Firul fracturi frului.

Produsul nu va ieie să utilizezi în mod repetat, acesta nu ar fi steril.

Principiile de manipulare: Produs este destinat pentru o singură utilizare!
Nu folosiți produse cu ambalaj deteriorat!
Înainte de utilizări, verificați data de expirare înscrisă pe ambalaj!

Nu utilizați produsul după data de expirare!
Nu sterilizați din nou!
Cu materiale de sutură pot manipula numai persoane instruite (medici, asistente medicale).

Procedură la deschiderea saculețului cu material de sutură steril: Scoateți saculețul din cutie netesit, prindeți cu ambele mâini și trageți mâinile până la deschide saculețul. În continuare lucrați degea sterili! Saculețul cu casorolă, nu deteriorați: după deschiderii pungii, selectați și descărcați tubul cu înveli, prin separarea părții învelișului tubului în locul perforației, prin instrument chiburea prindeți acul în partea de la 1/3 până la 1/2 distanței dintre capătul și vârful și prin trageri în direcție din tub, ușor scoateți înveliș. La scoaterea învelișului ușor griți pentru a menține sterilitatea. La scoaterea învelișului traumatic din tub, întotdeauna utilizați instrument chiburea.

Produsul este steril, fir scos în afară ambalajului este destinat pentru utilizare imediată!
Materialul rămas utilizat, lichidul în containere destinate - prevenirea rănirii personalului medical.
La corecții și descărca manipulare cu produsul, producător asigură o calitate absolută.

Sterilizare: Produsul este sterilizat prin radiație cu oxid de etilenă sau raze de radiație gamma.
Depozitare: Produsele trebuie depozitate în ambalajul original, în încăperi curate, uscate, la o temperatură de 10-25 °C, ferit de lumină și umezeală.

Contraindicații: Datorită neresorbabilității absolute, nu poate fi folosit la suturi, care ar trebui să fie înlocuite la structuri tubulare ale tractului digestiv și alilor urinare de eliminare.

Avvertiment: Atenție - Nu deteriorați firul cu instrumente chirurgicale (chiusuri,clește, pensete, etc.). Firul fracturi frului.

Produsul nu va ieie să utilizezi în mod repetat, acesta nu ar fi steril.

Principiile de manipulare: Produs este destinat pentru o singură utilizare!
Nu folosiți produse cu ambalaj deteriorat!
Înainte de utilizări, verificați data de expirare înscrisă pe ambalaj!

Nu utilizați produsul după data de expirare!
Nu sterilizați din nou!
Cu materiale de sutură pot manipula numai persoane instruite (medici, asistente medicale).

Procedură la deschiderea saculețului cu material de sutură steril: Scoateți saculețul din cutie netesit, prindeți cu ambele mâini și trageți mâinile până la deschide saculețul. În continuare lucrați degea sterili! Saculețul cu casorolă, nu deteriorați: după deschiderii pungii, selectați și descărcați tubul cu înveli, prin separarea părții învelișului tubului în locul perforației, prin instrument chiburea prindeți acul în partea de la 1/3 până la 1/2 distanței dintre capătul și vârful și prin trageri în direcție din tub, ușor scoateți înveliș. La scoaterea învelișului ușor griți pentru a menține sterilitatea. La scoaterea învelișului traumatic din tub, întotdeauna utilizați instrument chiburea.

Produsul este steril, fir scos în afară ambalajului este destinat pentru utilizare imediată!
Materialul rămas utilizat, lichidul în containere destinate - prevenirea rănirii personalului medical.
La corecții și descărca manipulare cu produsul, producător asigură o calitate absolută.

Sterilizare: Produsul este sterilizat prin radiație cu oxid de etilenă sau raze de radiație gamma.
Depozitare: Produsele trebuie depozitate în ambalajul original, în încăperi curate, uscate, la o temperatură de 10-25 °C, ferit de lumină și umezeală.

Contraindicații: Datorită neresorbabilității absolute, nu poate fi folosit la suturi, care ar trebui să fie înlocuite la structuri tubulare ale tractului digestiv și alilor urinare de eliminare.

Avvertiment: Atenție - Nu deteriorați firul cu instrumente chirurgicale (chiusuri,clește, pensete, etc.). Firul fracturi frului.

Produsul nu va ieie să utilizezi în mod repetat, acesta nu ar fi steril.

Principiile de manipulare: Produs este destinat pentru o singură utilizare!
Nu folosiți produse cu ambalaj deteriorat!
Înainte de utilizări, verificați data de expirare înscrisă pe ambalaj!

Nu utilizați produsul după data de expirare!
Nu sterilizați din nou!
Cu materiale de sutură pot manipula numai persoane instruite (medici, asistente medicale).

Procedură la deschiderea saculețului cu material de sutură steril: Scoateți saculețul din cutie netesit, prindeți cu ambele mâini și trageți mâinile până la deschide saculețul. În continuare lucrați degea sterili! Saculețul cu casorolă, nu deteriorați: după deschiderii pungii, selectați și descărcați tubul cu înveli, prin separarea părții învelișului tubului în locul perforației, prin instrument chiburea prindeți acul în partea de la 1/3 până la 1/2 distanței dintre capătul și vârful și prin trageri în direcție din tub, ușor scoateți înveliș. La scoaterea învelișului ușor griți pentru a menține sterilitatea. La scoaterea învelișului traumatic din tub, întotdeauna utilizați instrument chiburea.

Produsul este steril, fir scos în afară ambalajului este destinat pentru utilizare imediată!
Materialul rămas utilizat, lichidul în containere destinate - prevenirea rănirii personalului medical.
La corecții și descărca manipulare cu produsul, producător asigură o calitate absolută.

Sterilizare: Produsul este sterilizat prin radiație cu oxid de etilenă sau raze de radiație gamma.
Depozitare: Produsele trebuie depozitate în ambalajul original, în încăperi curate, uscate, la o temperatură de 10-25 °C, ferit de lumină și umezeală.

Contraindicații: Datorită neresorbabilității absolute, nu poate fi folosit la suturi, care ar trebui să fie înlocuite la structuri tubulare ale tractului digestiv și alilor urinare de eliminare.

Avvertiment: Atenție - Nu deteriorați firul cu instrumente chirurgicale (chiusuri,clește, pensete, etc.). Firul fracturi frului.

Produsul nu va ieie să utilizezi în mod repetat, acesta nu ar fi steril.

Principiile de manipulare: Produs este destinat pentru o singură utilizare!
Nu folosiți produse cu ambalaj deteriorat!
Înainte de utilizări, verificați data de expirare înscrisă pe ambalaj!

Nu utilizați produsul după data de expirare!
Nu sterilizați din nou!
Cu materiale de sutură pot manipula numai persoane instruite (medici, asistente medicale).

Procedură la deschiderea saculețului cu material de sutură steril: Scoateți saculețul din cutie netesit, prindeți cu ambele mâini și trageți mâinile până la deschide saculețul. În continuare lucrați degea sterili! Saculețul cu casorolă, nu deteriorați: după deschiderii pungii, selectați și descărcați tubul cu înveli, prin separarea părții învelișului tubului în locul perforației, prin instrument chiburea prindeți acul în partea de la 1/3 până la 1/2 distanței dintre capătul și vârful și prin trageri în direcție din tub, ușor scoateți înveliș. La scoaterea învelișului ușor griți pentru a menține sterilitatea. La scoaterea învelișului traumatic din tub, întotdeauna utilizați instrument chiburea.

Produsul este steril, fir scos în afară ambalajului este destinat pentru utilizare imediată!
Materialul rămas utilizat, lichidul în containere destinate - prevenirea rănirii personalului medical.
La corecții și descărca manipulare cu produsul, producător asigură o calitate absolută.

Sterilizare: Produsul este sterilizat prin radiație cu oxid de etilenă sau raze de radiație gamma.
Depozitare: Produsele trebuie depozitate în ambalajul original, în încăperi curate, uscate, la o temperatură de 10-25 °C, ferit de lumină și umezeală.

Contraindicații: Datorită neresorbabilității absolute, nu poate fi folosit la suturi, care ar trebui să fie înlocuite la structuri tubulare ale tractului digestiv și alilor urinare de eliminare.

Avvertiment: Atenție - Nu deteriorați firul cu instrumente chirurgicale (chiusuri,clește, pensete, etc.). Firul fracturi frului.

Produsul nu va ieie să utilizezi în mod repetat, acesta nu ar fi steril.

Principiile de manipulare: Produs este destinat pentru o singură utilizare!
Nu folosiți produse cu ambalaj deteriorat!
Înainte de utilizări, verificați data de expirare înscrisă pe ambalaj!

Nu utilizați produsul după data de expirare!
Nu sterilizați din nou!
Cu materiale de sutură pot manipula numai persoane instruite (medici, asistente medicale).

Procedură la deschiderea saculețului cu material de sutură steril: Scoateți saculețul din cutie netesit, prindeți cu ambele mâini și trageți mâinile până la deschide saculețul. În continuare lucrați degea sterili! Saculețul cu casorolă, nu deteriorați: după deschiderii pungii, selectați și descărcați tubul cu înveli, prin separarea părții învelișului tubului în locul perforației, prin instrument chiburea prindeți acul în partea de la 1/3 până la 1/2 distanței dintre capătul și vârful și prin trageri în direcție din tub, ușor scoateți înveliș. La scoaterea învelișului ușor griți pentru a menține sterilitatea. La scoaterea învelișului traumatic din tub, întotdeauna utilizați instrument chiburea.

Produsul este steril, fir scos în afară ambalajului este destinat pentru utilizare imediată!
Materialul rămas utilizat, lichidul în containere destinate - prevenirea rănirii personalului medical.
La corecții și descărca manipulare cu produsul, producător asigură o calitate absolută.

Sterilizare: Produsul este sterilizat prin radiație cu oxid de etilenă sau raze de radiație gamma.
Depozitare: Produsele trebuie depozitate în ambalajul original, în încăperi curate, uscate, la o temperatură de 10-25 °C, ferit de lumină și umezeală.

Contraindicații: Datorită neresorbabilității absolute, nu poate fi folosit la suturi, care ar trebui să fie înlocuite la structuri tubulare ale tractului digestiv și alilor urinare de eliminare.

Avvertiment: Atenție - Nu deteriorați firul cu instrumente chirurgicale (chiusuri,clește, pensete, etc.). Firul fracturi frului.

Produsul nu va ieie să utilizezi în mod repetat, acesta nu ar fi steril.

Principiile de manipulare: Produs este destinat pentru o singură utilizare!
Nu folosiți produse cu ambalaj deteriorat!
Înainte de utilizări, verificați data de expirare înscrisă pe ambalaj!

Nu utilizați produsul după data de expirare!
Nu sterilizați din nou!
Cu materiale de sutură pot manipula numai persoane instruite (medici, asistente medicale).

Avvertiment: Atenție - Nu deteriorați firul cu instrumente chirurgicale (chiusuri,clește, pensete, etc.). Firul fracturi frului.

Produsul nu va ieie să utilizezi în mod repetat, acesta nu ar fi steril.

Principiile de manipulare: Produs este destinat pentru o singură utilizare!
Nu folosiți produse cu ambalaj deteriorat!
Înainte de utilizări, verificați data de expirare înscrisă pe ambalaj!

Nu utilizați produsul după data de expirare!
Nu sterilizați din nou!
Cu materiale de sutură pot manipula numai persoane instruite (medici, asistente medicale).

Procedură la deschiderea saculețului cu material de sutură steril: Scoateți saculețul din cutie netesit, prindeți cu ambele mâini și trageți mâinile până la deschide saculețul. În continuare lucrați degea sterili! Saculețul cu casorolă, nu deteriorați: după deschiderii pungii, selectați și descărcați tubul cu înveli, prin separarea părții învelișului tubului în locul perforației, prin instrument chiburea prindeți acul în partea de la 1/3 până la 1/2 distanței dintre capătul și vârful și prin trageri în direcție din tub, ușor scoateți înveliș. La scoaterea învelișului ușor griți pentru a menține sterilitatea. La scoaterea învelișului traumatic din tub, întotdeauna utilizați instrument chiburea.

Produsul este steril, fir scos în afară ambalajului este destinat pentru utilizare imediată!
Materialul rămas utilizat, lichidul în containere destinate - prevenirea rănirii personalului medical.
La corecții și descărca manipulare cu produsul, producător asigură o calitate absolută.

Sterilizare: Produsul este sterilizat prin radiație cu oxid de etilenă sau raze de radiație gamma.
Depozitare: Produsele trebuie depozitate în ambalajul original, în încăperi curate, uscate, la o temperatură de 10-25 °C, ferit de lumină și umezeală.

Contraindicații: Datorită neresorbabilității absolute, nu poate fi folosit la suturi, care ar trebui să fie înlocuite la structuri tubulare ale tractului digestiv și alilor urinare de eliminare.

Avvertiment: Atenție - Nu deteriorați firul cu instrumente chirurgicale (chiusuri,clește, pensete, etc.). Firul fracturi frului.</